

知っておこう！

熱中症予防のために

知的・発達障害の方

「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

熱中症の症状

- めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
- 頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う

重症の症状

- 返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い



ご注意

暑さの感じ方は、人によって異なります

その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に気をつけましょう。

高齢者や子ども、障害者・障害児は、特に注意が必要です

- 熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対するからだの調整機能も低下しているので、注意が必要です。
- 子どもは体温の調節能力がまだ十分に発達していないので、気を配る必要があります。
- のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分補給しましょう。暑さを感じなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度調整するよう心がけましょう。

節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください

気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう。

熱中症についての情報

◎厚生労働省

熱中症関連情報

【施設紹介、熱中症予防リーフレット、熱中症診療ガイドラインなど】



「健康のため

STOP ! 热中水を飲もう
クールワークキャンペーン
推進運動



◎環境省

熱中症予防情報

【暑さ指数(WBGT)予報、熱中症環境保健マニュアル、
熱中症予防リーフレットなど】



◎気象庁

熱中症から身を守るために
【気温・予測情報、天気予報など】



異常天候
早期警戒情報



◎環境省

熱中症予防情報[熱中症による救急搬送の状況など]



暑さを避ける

室内では…

- 扇風機やエアコン温度を調節
- 遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用
- 室温をこまめに確認
- WBGT値※も参考に

※WBGT値：気温・湿度・輻射（放射）熱から算出される暑さの指標
運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。
環境省のホームページ（熱中症予防情報サイト）に、観測値と予想値が掲載されています。

外出時には…

- 日傘や帽子の着用
- 日陰の利用、こまめな休憩
- 気温が上がる日は、外出の時間帯や経路を工夫する

からだの蓄熱を避けるために…

- 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
- 保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

こまめに水分を補給する

室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液※などを補給する

※ 水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

熱中症が疑われる人を見かけたら

涼しい場所へ

エアコンが効いている室内や
風通しのよい日陰など、
涼しい場所へ避難させる

からだを冷やす

衣服をゆるめ、からだを冷やす
(特に、首の回り、脇の下、足の付け根など)

水分補給

水分・塩分、経口補水液※などを
補給する

※ 水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの

自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに
救急車を呼びましょう！

知的・発達障害の方が気をつけたい

6 の項目

case
1

発達障害がある方の中には、汗をかきにくい方や、暑さやどの渴きを感じることが苦手な方がいます。こまめに水分を取り、冷却グッズを活用しましょう。

case
2

体温計で検温するなど体調を確認し、体調が優れない日は外出を控えましょう。

case
3

自分から不調をうまく伝えられない方もいますので、排泄の回数や発汗の様子を慎重に観察し、室温もこまめにチェックしましょう。



case
4

特定の服装にこだわりがあり気温が高くても厚着をしてしまう方などがいて、熱中症のリスクになります。体に触れて、体温管理をしましょう。



case
5

重度の知的障害がある方の場合、「暑い」、「のどが渴いた」などをうまく伝えることができない人もいます。周囲の人は「具合が悪くないですか」など声掛けをしましょう。



case
6

気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意です。屋外で人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、適宜マスクをはずしましょう。

