

(令和2年8月1日以降生まれのお子様)

# ロタウイルス感染症予防接種の御案内

令和2年10月1日から、「ロタウイルスワクチン」は予防接種法に基づく「定期接種」になります。対象者は、令和2年8月1日以降に生まれた方で、接種期間はワクチンの種類ごとに異なります。重症胃腸炎の予防のため、ロタウイルスワクチンを接種しましょう。

## ロタウイルスワクチンに関する3つのポイント！

1

ワクチンは2種類あります。同じワクチンで、決められた回数の接種をしましょう。

2

1回目の接種は、生後14週6日までに行いましょう。


3

接種後1～2週間は、「腸重積症」に注意しましょう。



## ワクチンの種類や接種時期について

ロタウイルスワクチンの接種に当たっては、接種時期が他のワクチンより細かく規定されています。次の表を参考にして、令和2年10月1日以降に接種を行いましょう。  
(令和2年9月30日以前の接種は任意接種となり、費用は自己負担となります。)





### 年齢(出生週数)の考え方

			(例1) R2.8.2 生まれ	(例2) R2.8.20 生まれ
① 接種ができるようになる日 ※R2.9.30以前に接種したものは、任意接種(有料)となります。	出生6週0日	生まれてから6回目の、生まれた日と同じ曜日	R2.9.13 (任意接種)	R2.10.1
② 標準接種期間(接種をお勧めする期間)の開始日	生後2月	生まれてから翌々月の同日の前日	R2.10.1	R2.10.19
③ 1回目の標準的接種期間の終了日 ※出生15週0日後以降の接種はお勧めしていません。	出生14週6日後	生まれてから15回目の、生まれた日と同じ曜日の1日前 ※この日までに1回目の接種を完了してください	R2.11.14	R2.12.2
④ ロタテック(1価)の2回目接種終了日	出生24週0日後	生まれてから24回目の、生まれた日と同じ曜日 ※この日までに2回の接種を完了してください	R3.1.17	R3.2.4
⑤ ロタリックス(5価)の3回目接種終了日	出生32週0日後	生まれてから32回目の、生まれた日と同じ曜日 ※この日までに3回の接種を完了してください	R3.3.14	R3.4.1

## 接種後の注意 「腸重積症」について

腸重積症とは、腸管に腸管が入り込み、腸が閉塞状態になることです（下図）。ワクチン接種後1週間程度、腸重積の発症が、わずかですが上がる可能性が知られています。0歳児の場合、ロタウイルスワクチンを接種しなくても起こることがある病気なので、ワクチンを接種しなくても注意が必要です。もともと、4～5か月齢ぐらいから月齢が上がるにつれて多くなる病気（下のグラフ）ですので、早めにワクチンを接種完了しましょう。



腸重積症は、手術が必要になることもあります。発症後、すぐに治療すれば、ほとんどの場合、手術をせずに治療できます。以下のような症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 嘔吐を繰り返す
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血便がでる

受診をする場合は、必ずロタウイルスワクチンを接種したことを医師に伝えてください。

## ロタウイルスワクチンに関するQ&A

Q1 ロタウイルスワクチンの接種を受ける前後の授乳は避けた方が良いですか？

接種前後に哺乳制限はありません。しかし、哺乳後は嘔吐をする可能性があるため、接種後30分程の間隔をおいてから授乳することをお勧めしています。また、哺乳は、接種を受ける1～2時間前までに済ませて、少し空腹感がある方がワクチンの接種を受けやすいと考えられます。

Q2 2種類のワクチンの有効性に差はありますか？

どちらのワクチンを接種しても、ロタウイルスによる急性胃腸炎の重症化予防に対して、同等の効果があると考えられています。なお、接種したロタウイルスワクチンの種類は、母子健康手帳に記録されています。2回目以降も同じ種類のワクチンを接種しましょう。

Q3 他のワクチンとの同時接種は可能ですか？

医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。その場合、どちらのワクチンの接種を先に受けてもワクチンの効果に影響はありません。

### 問 合 せ

厚木市市民健康部健康づくり課 母子保健係 電話：(046) 225-2597 (直通)  
〒243-0018 厚木市中町1丁目4番1号 厚木市保健福祉センター2階